

Контактно-шлунковий інсектицид для боротьби з широким спектром шкідників

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

альфа-циперметрин, 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:

концентрат, що емульгується

УПАКОВКА:

пластикові канистри, 5 л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- високоефективний контактно-шлунковий інсектицид для боротьби з широким спектром шкідників рослин;
- інсектицид відзначається швидкою та тривалою дією на шкідників, ефективний на всіх стадіях розвитку комах;
- справляє винищувальну, а також репелентну, паралізуючу та антифідінгову дії на шкідників;
- завдяки досконалій формуляції діюча речовина надійно утримується на поверхні рослин та проявляє активність проти шкідників тривалий час;
- препарат використовується в малих нормах витрат, при яких виключається негативний вплив на довкілля;
- застосовується методом наземного та авіаційного обприскування;
- не володіє фітотоксичністю;
- володіє контактною, кишковою та антифідінговою властивостями;
- відсутність фітотоксичності.

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Активний компонент препарату альфа-циперметрин, як і всі синтетичні піретроїдні сполуки, спричиняє загибель шкідників через сильне збудження нервових клітин комах з наступним проявом параліча електричної активності центральної та периферійної нервової системи.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ:

Для досягнення високої ефективності в боротьбі зі шкідниками обробку рослин препаратом необхідно починати при чисельності шкідників, що відповідає економічному порозу шкодочинності. Забороняється застосовувати при температурі повітря і ґрунту вище 25°C

Препарат має репелентні та антифідінгові властивості по відношенню до корисних комах. В зв'язку з цим, після обробки інсектицид безпечний для медоносних бджіл.



КОНТАКТНО-ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦИД

ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Шкідник	Норма витрати препарату, кг/га	Строк обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця	П'явиці, клоп шкідлива черепаха, пшеничний трипс, попелиці, блішки, цикадки	0,1-0,15 0,1-0,15 (avia)	Обприскування в період вегетації	15	2
Горох	Зернівка горохова, трипси, попелиці	0,15-0,25		30	
Буряки цукрові	Лучний метелик, попелиці, блішки, довгоносики	0,1-0,25 0,1-0,25 (avia)		Не потр.	
Капуста	Міль, совки, білани	0,1-0,15		30	
Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці	0,1-0,15		30	
Картопля	Колорадський жук	0,07-0,1		20	
Яблуна	Плодожерки, листовійки, попелиці	0,15-0,25		45	
Землі несільськогосподарського призначення (дика рослинність, узбіччя доріг)	Саранові	0,2		-	
Лісові насадження	Золотогуз, шовкопряди	0,05-0,1		-	

Строки виходу для проведення механізованих робіт – 4 дні, ручних – 10 діб.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

II клас (помірнотоксичний). Помірнотоксичні для ссавців та риб.