



Системний високоефективний фунгіцид із захисною та лікувальною дією для обробки посівів озимої пшениці та озимого ріпаку від широкого спектра збудників грибних хвороб та володіє властивостями регулятора росту

ДІЮЧА РЕЧОВИНА

тебуконазол, 500 г/кг

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА

водорозчинні гранули

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- Високоефективний проти широкого спектра хвороб рослин;
- довготривалий період захисної дії;
- препарат володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією;
- препарат володіє ретардантними властивостями.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Діюча речовина тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи та, переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у ксилемі. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів. «Фарадей», в.г. володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ**ЯК ФУНГІЦИД:**

Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектра хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, несправжня борошниста роса, альтернаріоз, сіра гниль як профілактично, так і після ураження хворобою.

Обробку препаратом необхідно проводити при появі перших симптомів захворювання. Препарат проникає в рослину протягом 1-2 годин.

Період захисної дії препарату – 25–35 днів з моменту обробки.

